

בריאות ורווחת הילד בקהילה
Community Child Health & Well Being
صحة ورعاية الطفل في المجتمع المحلي



التواصل والتوحد



1. شاهدوا مقطع الفيديو الذي يعرض:
طفلا عمره عامان ونصف وطفل آخر عمره عام ونصف
2. اكتبوا لأنفكسم ما هي السلوكيات الشاذة في الفيلم





ما هو رأيكم؟

يحظى التشخيص المبكر بأهمية علاجية كبيرة



מִן יוֹד אֲנִי יִחְזַר?

أية نسبة من الأطفال الذين شُخِّصوا في العام الماضي
مع توحد تمت إحالتهم إلى الأطباء؟



ما هو رأيكم؟

العثور على أطفال مع توحد في المجتمع العربي منخفض
بأربعة أضعاف أسوأ بالمجتمع العام في إسرائيل.



ما هو اضطراب طيف التوحد (Autism)؟

اضطراب عصبي - تطوري

يتجسد الاضطراب في:

- 1 | نقص اجتماعي - تواصل
- 2 | قوالب سلوكيات صارمة ومجالات اهتمام خاصة ومتكررة




هناك اختلاف كبير بين أطفال لديهم اضطراب طيف التوحد (Autism Spectrum Disorder)

1. الاختلاف هو في أعراض التوحد (اختلاف في كل واحد من المعايير)
2. اختلاف في حدة القدرة اللغوية والإدراكية



Actual and projected % Prevalence of Autism in the US



In the above graph, statistics from CDC (2000 to 2008) and the US National Health Statistics Report (2013), Projection to 2020, indicate that the incidence of Autism is rising exponentially.




أسباب زيادة حالات طيف التوحد هي:

1. توسيع التعريف
2. تحريف التشخيص (diagnostic shift)
3. زيادة الوعي
4. تحسّن وسائل التشخيص والمهارات لدى الاختصاصيين
5. قانون واجب الإبلاغ للحصول على مساعدة في التربية الخاصة
6. الأبوة والأمومة في مرحلة متأخرة؟ علاجات الإخصاب خارج الرحم (IVF)؟ ولادة خُدج؟
تأثيرات بيئية؟ أسباب أخرى؟



سن التشخيص - فجوات بين الفئات السكانية



2011Christine Fountain, Marissa D King, and Peter S Bearman,



تشخيص طيف التوحد في إسرائيل

- تتغير نسبة انتشار الاضطراب بين منطقة وأخرى في البلاد، وهي تتراوح بين 0.5% و 0.8% (دكتور ميتشل. شعرتس، مؤتمر جمعية تطور الطفل، عام 2014).
- فجوة كبيرة بين الفئات السكانية: يُجرى التشخيص لدى الشرائح السكانية العامة أكثر منه لدى الشرائح السكانية الحاريدية، ونسبته أقل بأربعة أضعاف في المجتمع العربي.
- معدل عمر التشخيص: 24-30 شهرا (بيانات غير رسمية، وزارة الصحة)

عليكم الوقوف الآن...




أهمية الاكتشاف المبكر

تتحسن الأعراض في سن 6 سنوات لدى 11% من
الأطفال تقريبا الذين شُخصوا في سن 2-4 سنوات

Szatmari et al 2015



أهمية الاكتشاف المبكر



ضمن برنامج العلاج المكثف،
 طرأ التحسن الأكبر لدى الأطفال
 الذين بدأوا بتلقي علاج قبل سن
 عامين

Assessing progress and outcome of MacDonald et al.
 early intensive behavioral intervention for toddlers with
 2014autism

الأعراض المبكرة لاضطراب طيف التوحد في سن سنة

نقص التواصل غير الكلامي الضروري للتفاعل الاجتماعي

- نقص التواصل غير الكلامي الضروري للتفاعل الاجتماعي
- نقص إطلاق النغمات الموجهة نحو الآخرين
- خلل في استجابة الطفل عندما يناديه أحد باسمه (لا يلتفت عند سماع اسمه)
- خلل في الاستجابة للانتباه المشترك (Joint Attention): مشاركة الأفكار ولفت انتباه الآخرين نحو غرض يهتم به الطفل



الأعراض المبكرة لاضطراب طيف التوحد في سن 18 شهرا

نقص التواصل غير الكلامي الضروري للتفاعل الاجتماعي

- نقص الإيماءات

- تظهر القدرة على الإيماء لدى الأطفال مع تطور سليم مع ظهور الكلمات الأولى.
- تطور القدرة على الإيماء - استخدام الذراع، كف اليد، والإصبع.
- تُرافق الإيماءة نظرة هادفة.

- لا يعرض الطفل أغراضا/ لا يعطي أغراضا للآخرين.

نقص المبادرة إلى الانتباه المشترك (joint attention): لا يبادر الطفل إلى الانتباه المشترك بهدف مشاركة فرحته ("ماما! طيارة")



اقرأوا القصص التالية وأشيروا إلى التفاصيل التي تثير
لديكم في كل قصة شكاً وخطوطاً حمراء لوجود مشكلة في
التواصل.



حاولوا أن تتذكروا حالات كنتم قد عالجتُموها:

تحدثوا عن أولاد كنتم قد رافقتُموهم وشعرتم أن "شيئاً ما ليس على مايرام"، ولكن لم تعرفوا ما هي المشكلة، وفي النهاية، شُخصَ الطفل بأنه يعاني من التوحد.



اختاروا قصة شككتهم فيها بمشكلة في التواصل. شاركوا الوالدين بالمعلومات، ولكن لا تحدّدوا التشخيص.



الأطر والمساعدة

سن ثلاث حتى ست سنوات

- روضات السنابل للتربية الخاصة - بيت حنيئا
- روضة الزيتون للتربية الخاصة - أبو طور
- روضة جديدة أخرى - صورة باهر

سن الولادة حتى ثلاث سنوات


- مؤسسة رند القطرية للتربية الخاصة - بيت حنيئا



الآن دوركم:



صحيح أو غير صحيح



في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، أصبح اضطراب طيف التوحد شائعاً وأخذ بالانتشار بشكل متتال



صحيح أو غير صحيح



بدء العلاج قبل سن عامين يزيد احتمال دفع تطور الطفل
قدما دفعا ملحوظا

صحيح أو غير صحيح

قد تظهر العلامات المبكرة كعلامة وحيدة أو كجزء من
علامات أخرى



شُكْرًا.

