

מה חשוב לדעת על בריחת צואה (אנקופרזיס)?

בריחת צואה, אנקופרזיס, היא העברה של צואה במקומות לא מותאמים בילד מעל גיל 4 שנים. במרבית המקרים, מדובר בהעברה לא רצונית או מוכוונת, הנובעת מעצירות ממושכת, לרוב על רקע התנהגותי. הביטוי יהיה בדליפה, overflow של צואה בתחתונים.

על מה
אנחנו בעצם
מדברים?



סימנים מתאימים לעצירות:

1. תדירות נמוכה של יציאות
2. יציאות בעלות מרקם קשה
3. מאמץ בזמן יציאה
4. כאבים בזמן יציאה

מה צריך
להדליק לך
נורה אדומה?



- סימפטומים וסימנים המחשידים לפגיעה נירולוגית (חולשת שרירים, רפלקסים לא תקינים, וכו')
- חשד לפגיעה גופנית/מינית

1. 4% מהילדים בגילאי 17-4 סובלים מאנקופרזיס, והשכיחות בבנים גבוהה פי 5 בהשוואה לבנות
2. מרבית המקרים נובעים מעצירות
3. לרוב אין צורך בבדיקות עזר או בדיקות הדמיה
4. הטיפול הוא שילוב של טיפול תרופתי- לצורך התרוקנות המעי וריכוך צואה, וטיפול התנהגותי- בשיקום הרגלי היציאות, תוך ישיבות קבועות בשירותים
5. תחת טיפול מתאים- כמעט כל הילדים יראו שיפור בפספוסים, אך התהליך עשוי להיות ממושך. ב-30-50% יושג פתרון מוחלט תוך כשנה, וב-75-48% יושג פתרון מוחלט תוך 5 שנים.

5 דברים
שכדאי
לדעת



רוצה
לדעת עוד?

בריחת צואה (אנקופרזיס) ←

מאמר review ←



לחצו על כל אחת מהכותרות
למעבר לדף באתר 'איך גדלת!'

עצירות ←

הרטבת לילה ←

שבחים, חיזוקים ותגמולים ←

נושאים
קשורים

